

Standard perioperative SCHMERZTHERAPIE

am Krankenhaus Radolfzell

Analgetika-Gabe

ZIEL: Schmerzscore < 3 auf der 10er Scala

Verordnet durch		Präoperativ	intraoperativ	postoperativ	
Bereich	Eingriffsart	Anästhesie			Stationsarzt/ Verordnungsblatt postop.
		Prämedikation	Narkose	Aufwachraum	Station
HNO	TE/ AT Kind ab 10 kg bis 14 Jahre	Paracetamol 500 mg Supp + Dormicum Saft/ Tbl. nach Gewicht	Dexamethason + Dipidolor	Dipidolor	Paracetamol Supp weiter Tageshöchst dosis 100 mg/ kg KG beachten
	TE/ AT / SO etc. ab 14 Jahre	Voltaren 100 mg Supp + Pantozol 1 Tbl. po + Dormicum 1 Tbl.	Dexamethason + Dipidolor	Novalgin KIF Dipidolor	Voltaren Supp od. res. 2 x tgl. Valoron ret 2 x 1 Tbl. Novalgin Trpf.
GYN	alle Eingriffe	Voltaren 100 mg Supp + Pantozol 1 Tbl. po + Dormicum 1 Tbl. po	Dexamethason + Dipidolor	Dipidolor Novalgin KIF ggf. PCA-Pumpe	Voltaren Supp od. res. 2 x tgl. Valoron ret. 2 x 1 Tbl. Novalgin Trpf. / KIF 1g/30 min Oxygesic 10 mg 2 x 1 Tbl. ggf. PCA-Pumpe
CHIR	wenig schmerzhaft b. gesunden Pat. (Varizen) kleinerer abdominalchir. Eingriff (AE, LH, CHE) Struma	Voltaren 100 mg Supp + Pantozol 1 Tbl. po + ggf. Dormicum 1 Tbl. po	Dexamethason + Dipidolor	Novalgin KIF Dipidolor	Voltaren Supp od. res. 2 x tgl. Valoron ret. 2 x 1 Tbl. Novalgin Trpf. / KIF 1g/30 min
	Unfallchir. Eingriff (Knochen)	Voltaren 100 mg Supp + Pantozol 1 Tbl. po + ggf. Dormicum 1 Tbl. po	Dexamethason + Dipidolor	Novalgin KIF Dipidolor	Voltaren Supp od. res. 2 x tgl. Valoron ret 150 mg 2 x 1 Tbl. Valoron Trpf Novalgin Trpf. / KIF 1g/30 min Oxygesic 10 mg 2 x 1 Tbl. (bis 2 x 40 mg)
	großer abdominalchir. Eingriff (Magen, Darm)	ggf. Dormicum 1 Tbl. po	Dexamethason + Dipidolor	Perfalgan 1g KIF Dipidolor Novalgin KIF	Voltaren Supp od. res. 2 x tgl. Dipidolor-Bolusgabe Novalgin KIF 1g/30 min PCA-Pumpe ggf. PDK
	hochschmerzhaft b. polymorbiden Risikopat. (Nierenschaden)	Valoron ret. 1 Tbl. + ggf. Dormicum 1 Tbl. po	Dipidolor	Novalgin KIF Dipidolor	Valoron ret. 2 x 1 Tbl. Novalgin Trpf. / KIF 1g/30 min Oxygesic 10 mg 2 x 1 Tbl. (bis 2 x 40 mg) ggf. PCA-Pumpe

Antiemetikagabe:

- präoperativ bei entsprechender Anamnese / Verordnung auf Prämedikationsblatt
- postoperativ bei Bedarf: Vomex A 150 mg Supp, Psyquil Supp, MCP iv, Anemet iv.

Beachte:

- bei Diabetes und/ oder Niereninsuffizienz Kontraindikation für Dexamethason und NSAR